

Epilepszia

Kezelés

Az epilepszia egy krónikus betegség, mely érinti

1–5% -át a szakrendelésre
utalt kutyá
pácienseknek

csaknem
0,6% -át a beutaló praxisok
betegeinek¹.

Az epilepsziának számos különböző fajtája létezik, de az idiópatás (nem ismert eredetű) epilepszia a vezető kórok a neurológiai problémákkal diagnosztizált kutyáknál.²

Az epilepszia nem csak az érintett állat életminőséget romtja, hanem a tulajdonosát is, köszönhetően a bizonytalan gyakorisággal előforduló rohamoknak.³

Rizikófaktorok

Predisponált fajták
(genetikai faktor)

Border collie, német boxer, cavalier king charles spániel, golden retriever, labrador retriever, ír farkaskutya, tacskö.⁴



Miért következnek be a rohamok?

A rohamok akkor következnek be, ha az agyban lévő neuronok anomális elektromos aktivitásnak vannak kitíve. Normál körfülmények között az agy megelőzi ezeket az abnormális elektromos tevékenységeket számos járőr mechanizmus segítségevel, de a roham bekövetkezik, ha felborul az egységes tevékenységen.⁷

Kor

Az epilepszia rohamok előfordulása először 6 hónapos és 6 éves kor között jellemző.⁵



A rohamok hirtelen és megjósoltatlan módon alakulnak ki. A tulajdonosok számára ez állandó kiszámíthatatlanságot okoz, mely érzelmeli stresszhez vezet.



Ivari
predispozíció
kan>szuka⁶



Antiepileptikum (AED) terápia

Az antiepileptikus szerek, mint a fenobarbital vagy a kálium-bromid gyakran használt készítmények a rohamok elfordulásának csökkenésére.⁶

- Miközben ezek a szerek hatékonyak, melékhatásokkal is rendelkeznek (polifágia, testtömeg gyarapodás, poldipszia, poliuria, szedáció, nyugtalanság, letargia vagy ataxia).
- Az antiepileptikumokra adott nem kívánt hatások a tulajdonosok által az életminőséget romtásának okaként említettek között.⁹
- A megfelelően hatékony és a legkevesebb mellékhatást kiváltó adag beállítása nagyon fontos.

Hogyan érjük el, hogy a terápia sikeres legyen?

Említett fontos egy olyan adjuváns terápia alkalmazása, mely segít javítani az epilepszias kutyák tüneteinei.
A sikeres kifejtést érdekében a tulajdonos és a beteg együttműködése kulcsfontosságú. Fontos megbizonyosodni arról, hogy a tulajdonos a feliratok megfelelően alkalmazza a gyógyszereket. Ennek elhanyagolása rosszabb következményekkel járhat, mint a kezelés hiánya.

20–30%-a

Az idiópatás epilepsziában szenvedő kutyák több, mint 66%-a

szenved állandó rohamoktól